

färbt. Die zehn oder elf Umgänge werden durch eine oben weniger deutlich, nach unten deutlich rinnenförmige Naht geschieden; die oberen fünf kaum gewölbt und mit je fünf Furchen versehen, welche durch gleichmässige etwas breitere flache Rippen geschieden werden, die wieder mit unregelmässigen kurzen unzusammenhängenden strichartigen Runzeln skulptirt sind. Der vorletzte und namentlich der letzte Umgang sind stärker gewölbt und mit deutlichen Anwachstreifen versehen, die Spiralskulptur ist fast obsolet, nur an der Basis des letzten Umganges stehen 3—4 Spiralfurchen. Die Mündung ist schräg nach links gerichtet, oben spitz, unten mit deutlichem Ausguss, innen mit bläulichem Perlmutterbeleg, die Spindel ist oben fast gerade, schwielig, unten leicht gedreht mit einer undeutlichen Falte; der Aussenrand ist dünn und scharf.

Aufenthalt bei Hakau in der japanesischen Provinz Higo.

---

### Diagnosen neuer chinesischer Arten.

Von

Dr. O. v. Möllendorff.

*Helix applanata n. sp.*

Testa late umbilicata, orbiculato-depressa, acute carinata, oblique rugoso-striatula, subtilissime spiraliter lineolata, cuticula in lamellas tenuissimas plerumque interruptas elevata, pallide corneo-fusca; spira plana; anfractus 6 planati, ultimus ad carinam fimbriis latiusculis approximatis ornatus, inferne inflatus, circa umbilicum obtuse angulatus, antice non descendens; apertura sat obliqua rhombeo-securiformis, margine supero recto, infero gibbose arcuato, breviter reflexo.

Diam. maj. 24, min. 21, alt. 8 mm.

Hab. prope urbem Fu-dshou, prov. sinensis Fu-dshien, leg. cl. F. Eastlake.

*Helix Caspari n. sp.*

Testa aperte umbilicata, depresso globoso-conoidea, solida, curvatim oblique rugoso-striata, nitens, obscure castaneo-fusca, ad peripheriam distincte angulata vel fere carinata, et fascia sat angusta pallide fusca ornata; anfractus 6 vix convexi, ultimus antice breviter deflexus. Apertura diagonalis, lunato-elliptica, intus fusco-violacea, peristoma sat expansum, reflexiusculum, incrassatum, marginibus callo tenuissimo junctis, columellari dilatato, umbilicum partim obtegente.

Diam. maj. 47, min. 38, alt. 30 mm.

Hab. Hunan, leg. P. K. Fuchs.

*Helix Friesiana n. sp.*

Testa anguste umbilicata, globoso-conoidea, oblique striatula et lineis spiralibus rugulosis decussata, brunnea, ad peripheriam fascia atrofusca perangusta signata, spira conoidea, apice acutiusculo; anfractus 6 subplani sutura vix impressa discreti, ultimus acute carinatus, antice vix descendens, subtus compressus, pone aperturam subapplanatus: apertura diagonalis, lunato-elliptica; peristoma expansum, vix reflexum, marginibus callo tenuissimo junctis, margine basali fere horizontali, callose incrassato, columellari dilatato, incrassato, umbilicum angustum fere dimidio obtegente.

Diam. maj. 29,5, min. 25, alt. 21 mm.

Hab. in parte meridionali insulae Formosae prope Da-gou urbem, leg. cl. eques de Fries.

*Helix stenozona n. sp.*

Testa umbilicata, conoideo-depressa, tenuis, oblique curvatim striata, lineis spiralibus tenuissimis decussata, straminea, fascia peripherica perangusta fusca picta; anfractus  $5\frac{1}{2}$  convexiusculi, ultimus ad peripheriam

obtuse angulatus, antice vix deflexus, basi subcompressus, circa umbilicum subangulatus; apertura obliqua, rotundato-lunaris; peristoma breviter expansum, vix reflexiusculum, albidum, marginibus callo tenuissimo junctis, margine basali subhorizontali calloso-incrassatulo, columellari dilatato.

Diam. maj. 23, min. 19, alt. 14,5 mm.

Hab. prope urbem Fu-dshou prov. sinensis Fu-dshien, leg. cl. Eastlake.

---

### **Clausilia orthostoma Mke.**

in Thüringen nördlich der Rhön.

Bei meinen alljährlich wiederkehrenden Excursionen zur Forellenfischerei im Eisenacher Oberland und dem Rhöngebirge nehme ich gewöhnlich an den Stunden, in welchen ich dem Angelsport nicht obliegen kann, Gelegenheit, der dortigen Conchylienfauna meine Aufmerksamkeit zu schenken. Schon manches Interessante habe ich dabei eingeheimst. Mein letzter Ausflug Ende Juni d. J. galt dem bei Vacha gelegenen Ochsenberge mit seinem herrlichen Panorama. Wider Erwarten sollte mir daselbst eine ganz besondere Freude zu Theil werden durch das Auffinden einer Clausilienart, welche bisher weder von der Rhön noch vom Eisenacher Oberland bekannt war. Es ist dies die *Claus. orthostoma Mke.*, nach S. Clessin fast in ganz Mitteldeutschland fehlend. Es gereicht mir zum besonderen Vergnügen, diesen neuen Fundort hiermit constatiren zu können.

Frankfurt a. M.

Bruno Strubell.

---